

الصفحة  
1  
4

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

## الدورة العادية 2013

### الموضوع



NS25

المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

4	مدة الاجتياز	الرياضيات	المادة
9	المعامل	شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب) (الترجمة الفرنسية)	الشعبة، أو المسلك

- La durée de l'épreuve est de 4 heures.
- L'épreuve comporte trois exercices et un problème indépendants deux à deux.
- Les exercices et le problème peuvent être traités selon l'ordre choisi par le candidat.

- Le premier exercice se rapporte aux structures algébriques.
- Le deuxième exercice se rapporte aux nombres complexes.
- Le troisième exercice se rapporte à l'arithmétique.
- Le problème se rapporte à l'analyse.

**L'USAGE DES CALCULATRICES NON PROGRAMMABLES EST AUTORISE**

L'usage de la couleur rouge n'est pas permis

**Exercice1 : (3,5pts)**

On rappelle que  $(\square, +, \times)$  est un anneau commutatif, unitaire et intègre.

1- On munit  $\square$  de la loi de composition interne  $*$  définie par :

$$(\forall (x, y) \in \square^2) ; x * y = x + y - 2$$

a) Montrer que la loi  $*$  est commutative et associative.

b) Montrer que  $(\square, *)$  admet un élément neutre que l'on déterminera.

c) En déduire que  $(\square, *)$  est un groupe commutatif.

2- On munit  $\square$  de la loi de composition interne  $T$  définie par :

$$(\forall (x, y) \in \square^2) ; xTy = xy - 2x - 2y + 6$$

et on considère l'application  $f$  de  $\square$  dans  $\square$  définie par :  $(\forall x \in \square) ; f(x) = x + 2$

a) Montrer que l'application  $f$  est un isomorphisme de  $(\square, \times)$  dans  $(\square, T)$

b) Montrer que :  $(\forall (x, y, z) \in \square^3) ; (x * y)Tz = (xTz) * (yTz)$

3- En déduire de tout ce qui précède que  $(\square, *, T)$  est un anneau commutatif et unitaire.

4-a) Montrer que :  $xTy = 2$  si et seulement si  $(x = 2 \text{ ou } y = 2)$

b) En déduire que l'anneau  $(\square, *, T)$  est intègre.

c)  $(\square, *, T)$  est-il un corps ? (justifier votre réponse)

**Exercice2 : (3,5pts)**

I- Soit  $a$  un nombre complexe non nul.

Soit dans l'ensemble  $\square$  l'équation d'inconnue  $z$  :  $(E) : 2z^2 - (3 + i\sqrt{3})az + (1 + i\sqrt{3})a^2 = 0$

1- Vérifier que le discriminant de l'équation  $(E)$  est :  $(-1 + i\sqrt{3})^2 a^2$

2- Résoudre dans  $\square$  l'équation  $(E)$

II- Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On considère les points  $A$ ,  $B$  et  $M$  d'affixes respectifs  $a$ ,  $b = ae^{i\frac{\pi}{3}}$  et  $z$

Soit  $r$  la rotation de centre  $M$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$

On pose  $A_1 = r^{-1}(A)$  et  $B_1 = r(B)$  ( $r^{-1}$  désigne la rotation réciproque de  $r$ )

et soient  $a_1$  et  $b_1$  les affixes respectifs de  $A_1$  et  $B_1$

1- Vérifier que le triangle  $OAB$  est équilatéral.

2- a) Montrer que :  $a_1 = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a + \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$  et  $b_1 = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a + \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$

b) Montrer que le quadrilatère  $OA_1MB_1$  est un parallélogramme.

3- On suppose que :  $M \neq A$  et  $M \neq B$

a) Montrer que :  $\frac{z - b_1}{z - a_1} = -\frac{z - b}{z - a} \times \frac{a}{b}$

0.75 b) Montrer que  $M$ ,  $A_1$  et  $B_1$  sont alignés si et seulement si  $M$ ,  $O$ ,  $A$  et  $B$  sont cocycliques.

### Exercice3 :(3pts)

L'objectif de l'exercice est de chercher les entiers naturels  $n$  strictement supérieurs à 1 et qui vérifient la propriété suivante :  $(R): 3^n - 2^n \equiv 0 \pmod{n}$

1-On suppose que  $n$  vérifie la propriété  $(R)$  et soit  $p$  **le plus petit diviseur premier positif** de  $n$ .

0.75 a) Montrer que :  $3^n - 2^n \equiv 0 \pmod{p}$ , en déduire que  $p \geq 5$

0.5 b) Montrer que :  $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$  et  $3^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

0.5 c) Montrer qu'il existe un couple  $(a, b)$  de  $\mathbb{Z}^2$  tel que :  $an - b(p-1) = 1$

0.5 d) Soient  $r$  et  $q$  le reste et le quotient de la division euclidienne de  $a$  par  $p-1$

$$(a = q(p-1) + r \text{ avec } 0 \leq r < p-1 \text{ et } q \in \mathbb{Z})$$

Montrer qu'il existe **un entier naturel**  $k$  tel que :  $rn = 1 + k(p-1)$

0.75 2- En déduire de tout ce qui précède qu'il n'existe pas d'entier naturel  $n$  strictement supérieur à 1 vérifiant  $(R)$

### Problème :(10pts)

On considère la fonction numérique  $h$  définie sur l'intervalle  $[1, +\infty[$  par :

$$h(1) = 1 \text{ et } (\forall x > 1); h(x) = \frac{x-1}{x \ln x}$$

#### Première partie :

0.25 1-a) Montrer que la fonction  $h$  est continue à droite en 1

0.75 b) Montrer que :  $(\forall x > 1); \ln x < x-1$ , en déduire que la fonction  $h$  est strictement décroissante sur l'intervalle  $]1, +\infty[$

0.5 2-a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$  puis donner le tableau de variations de  $h$

0.25 b) En déduire que :  $(\forall x \geq 1); 0 < h(x) \leq 1$

#### Deuxième partie :

On considère la fonction numérique  $g$  définie sur l'intervalle  $[1, +\infty[$  par :

$$g(1) = \ln 2 \text{ et } (\forall x > 1); g(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{t} \ln t} dt$$

Soit  $(C)$  la courbe représentative de la fonction  $g$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

0.25 1-a) Vérifier que :  $(\forall x > 1); \int_x^{x^2} \frac{1}{t \ln t} dt = \ln 2$

0.25 b) Vérifier que :  $(\forall x > 1); g(x) - \ln 2 = \int_x^{x^2} \frac{\sqrt{t}-1}{t \ln t} dt$

0.5 c) Montrer que :  $(\forall x > 1); g(x) - \ln 2 = \int_{\sqrt{x}}^x \frac{t-1}{t \ln t} dt$

الصفحة 3 4	NS25	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2013 - الموضوع - مادة: الرياضيات - شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب) (الترجمة الفرنسية)
0.5		2-a) Montrer que : $(\forall x > 1) ; (x - \sqrt{x})h(x) \leq g(x) - \ln 2 \leq (x - \sqrt{x})h(\sqrt{x})$
0.5		b) En déduire que la fonction $g$ est dérivable à droite au point 1
0.75		c) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$
0.75		3-a) Montrer que $g$ est dérivable sur l'intervalle $]1, +\infty[$ et que : $(\forall x > 1) ; g'(x) = \frac{1}{2}h(\sqrt{x})$
0.5		b) En déduire que : $(\forall x \geq 1) ; 0 < g'(x) \leq \frac{1}{2}$ , puis donner le tableau de variations de $g$
0.5		c) Construire la courbe $(C)$
		<b>Troisième partie :</b>
0.5		I-1- Montrer que la fonction $k : x \mapsto g(x) - x + 1$ est une bijection de l'intervalle $[1, +\infty[$ dans l'intervalle $] -\infty, \ln 2]$
0.25		2- En déduire qu'il existe un unique réel $\alpha$ de l'intervalle $]1, +\infty[$ qui vérifie : $1 + g(\alpha) = \alpha$
		II- On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par :
		$1 \leq u_0 < \alpha \text{ et } (\forall n \geq 0) ; u_{n+1} = 1 + g(u_n)$
0.5		1- a) Montrer que : $(\forall n \geq 0) ; 1 \leq u_n < \alpha$
0.5		b) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante.
0.75		c) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$
0.5		2-a) Montrer que : $(\forall n \geq 0) ;  u_{n+1} - \alpha  \leq \frac{1}{2} u_n - \alpha $
0.5		b) Montrer que : $(\forall n \geq 0) ;  u_n - \alpha  \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n  u_0 - \alpha $
0.25		c) En déduire une deuxième fois, que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$

FIN